

ACICLOVIR

Virustatikum

Darreichungsformen/Wirkstoffstärken

ORAL *fest*: 200 mg, 400 mg, 800 mg

EXTERN *salbenförmig*: 0,50 mg/g

Wogegen ?

Gürtelrose (Herpes zoster), Lippenherpes, Herpes genitalis (Erst- und Wiederholungs-erkrankung), Herpes-Infektion der Hornhaut

Wieviel ?

Oral:

- bis zu 5 x tgl. 200 bis 800 mg

Extern:

- alle 4 Stunden bis zu 5 x tgl. dünn auftragen.

ED_{max} 800 mg

TD_{max} 4.000 mg

Wann ?

Einnahme der Tabletten im Abstand von 4 Stunden. Das Zeitintervall ist möglichst exakt einzuhalten

Die externe Anwendung ist in der Regel 5, maximal jedoch 10 Tage lang durchzuführen

☞ Verträglichkeit

Häufig

Oral: Kopfschmerzen

Selten

Oral: Magen-Darm-Beschwerden

Extern: irritative Reaktionen, vor allem auf Schleimhäuten

⚖ Wechselwirkungen

Keine bekannt

⚡ (Warn-)Hinweise

Externe Zubereitungen sind vor Kälte (< 8 °C) und Hitze (> 25 °C) zu schützen (Auto!)

® Fertigarzneimittel

•

•

•

DIESE ANGABEN SIND NICHT VOLLSTÄNDIG UND DIENEN NUR ZUR SCHNELLINFORMATION!