

für: **N. N.** (Geb. 01.09.1942, 81 Jahre, weiblich, 1,69 m, 96,00 kg, BMI 34, 120 / 76 mmHg, GFR 33 ml/min)

Folgende Eingabedaten wurden der Apotheke (vom Patienten) mitgeteilt:

**Weitere Angaben zum Patienten:** 1) kriegt schlecht Luft und eingeschränkte Laufstrecke 2) kommt nur mit Kraft ein paar Schritte 3) Luftnot durchs Laufen Kreuzschmerzen, nicht therapiert Augenuntersuchung? Ist etwas her. Vorbildliche Patientin in vielen Bereichen. Novaminsulfon wird zu wenig genommen.

**Probleme / Symptome:** *Adipositas (BMI > 30 kg/m<sup>2</sup>)*

**Erkrankungen / Allergien / Lebensumstände:** Herzinsuffizienz (NYHA II-IV mit LVEF kleiner gleich 35%), Schmerz (stark), Thromboembolie bei nicht-valvulärem Vorhofflimmern mit mindestens 1 Risikofaktor, Ödem (kardial), Herzinsuffizienz (LVEF kleiner gleich 40%) nach Herzinfarkt, Vorhofflimmern (paroxysmal), Hypercholesterinämie (familiär, heterozygot), Herzinsuffizienz (NYHA II-IV mit LVEF < 35-40%), Adipositas (BMI > 30 kg/m<sup>2</sup>), Niereninsuffizienz (chron., CKD-Stadium G3b, mäßig – schwer, GFR 30-44 ml/min)

**Labor- / Vitalwerte:** Body-Mass-Index (†)

**Medikation:** Tilidin hydrochlorid (50 mg), Tilidin (44,12 mg), Naloxon hydrochlorid (4 mg), Naloxon (3,6 mg), Metamizol natrium-1-Wasser (500 mg), Bisoprolol fumarat (2,5 mg), Eplerenon (50 mg), Sacubitril (48,6 mg), Valsartan (51,4 mg), Sacubitril (97,2 mg), Valsartan (102,8 mg), Atorvastatin (80 mg), Torasemid (10 mg), Apixaban (5 mg), Amiodaron hydrochlorid (200 mg), Natriumsulfat-10-Wasser (1 g), Pantoprazol (40 mg), Levothyroxin natrium (0,025 mg), Bromazepam (6 mg)

Arzneimittel	Form	Menge	Dosierung	Einheit	Grund
Tilidin AL comp. 50mg/4mg	RET	100 St (N3)	0 - 0 - 1 - 0 wirken nicht wirklich.	Stück	Schmerz (stark)
Novaminsulfon 500mg Lichtenstein	TRO	100 ml (N3)	35 - 0 - 0 - 0	Tropfen *	
BisoHEXAL 2,5mg	FTA	100 St (N3)	1 - 0 - 0 - 0	Stück	Herzinsuffizienz (NYHA II-IV mit LVEF < 35-40%)
Eplerenon Zentiva 50mg	FTA	100 St (N3)	1 - 0 - 0 - 0	Stück	Herzinsuffizienz (LVEF kleiner gleich 40%) nach Herzinfarkt
Entresto 49mg/51mg	FTA	196 St (N3)	1 - 0 - 1 - 0 Wird noch genommen.	Stück	Herzinsuffizienz (NYHA II-IV mit LVEF kleiner gleich 35%)
Entresto 97mg/103mg	FTA	196 St (N3)	1 - 0 - 1 - 0 wird erst genommen.	Stück	
Atorvastatin-ratiopharm 80mg	FTA	100 St (N3)	0 - 0 - 1 - 0	Stück	Hypercholesterinämie (familiär, heterozygot)
Torasemid HEXAL 10mg	TAB	100 St (N3)	1 - 1 - 0 - 0	Stück	Ödem (kardial)
Eliquis 5mg	FTA	200 St (N3)	1 - 0 - 1 - 0	Stück	Thromboembolie bei nicht-valvulärem Vorhofflimmern mit mindestens 1 Risikofaktor
Amiodaron Winthrop 200mg	TAB	100 St (N3)	1 - 0 - 0 - 0	Stück	Vorhofflimmern (paroxysmal)
GLAUBERSALZ	PUL	100 g	0 - 0 - 0 - 0	mg	
Pantoprazol-1A Pharma 40mg	TMR	100 St (N3)	1 - 0 - 0 - 0 30 Minuten vor dem Essen	Stück	
L-Thyrox HEXAL 25 Mikrogramm	TAB	100 St (N3)	1 - 0 - 0 - 0 wird nach dem Kaffee genommen.	Stück	
Bromazaniil 6mg	TAB	50 St (N3)	0 - 0 - 0 - 0 0,5 Tablette zur Nacht	Stück	

\* Dosis nicht automatisiert überprüft

**Zusammenfassung an Arzt (Fachreise):**

Was würden Sie sagen? :-)

**RÜCKMELDUNG GEBEN**

zur Zusammenfassung.